

Протокол подведения итогов закупа

«Закуп лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения (далее – товар) для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи способом запроса ценовых предложений в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»

ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» УЗ г.Алматы

20 мая 2019г. 10.00ч

г.Алматы

Присутствовали:

Садуева К.А.. (зам.директора) – председатель комиссии
Ахметова Д.Ш. - (глакusherка) – заместитель председателя
Убулова Г.Т.(и.о.главного бухгалтера) – член комиссии
Оразаева Ж.И (провизор) – член комиссии
Бабаева З.М. (и.о.заведующий отделением ОАРИН) – член комиссии
Сабекова А.А. (заведующий лабораторией) – член комиссии
Сарлыбаев Н. – (юрист) член комиссии
Секретарь комиссии - Сатыбалдиева М.А

1. ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Подведение итогов и определение победителей по закупу способом запроса ценовых предложений «Закуп лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения (далее – товар) для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи способом запроса ценовых предложений в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»

2. ПОСТАНОВИЛИ:

1. Определить победителей и заключить договор закупки способом запроса ценовых предложений с потенциальными поставщиками в нижеследующем порядке:

В соответствии с «Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила):

Сумма выделенная на закуп составляет:

Итого: 3 162 550 тенге 00тиын (таблица №1)

Таблица №1

№ Лота	Наименование	Тех. характеристика	Ед. изм.	Цена, тг	Кол-во	Сумма
1	Представляет собой прозрачную жидкость зеленого цвета со специфичным запахом, хорошо смешивающуюся с водой. В состав средства в качестве действующих веществ входят: 22 грамма бензалкония хлорида (бензил-С12-18-алкилдиметиламмоний, хлориды), 17 грамм 2-феноксизанола, 0,9 грамм аминоксилглицина (амины, п-С10-16-алкилтриметиленединовые и продукты реакции из хлор уксусной кислоты, антикоррозийные добавки), бензионные тенсилды, рН средства 8,6. Рабочие растворы можно использовать в течение 30 дней после разведения	Для обработки поверхностей, Во флаконах объемом 2 л.	фл	15050	30	451 500,00
2	Тип средства: жидкий концентрат. Состав средства: ЧАС (алкилдиметилбензиламмоний хлорид, алкилдиметилэтилбензиламмоний хлорид и дидецилдиметиламмония хлорид) – не более 18,5% (суммарно), спирт изопропиловый – не более 4%, функциональные компоненты. рН средства 7,5+0,8. Средство не должно содержать активного хлора, перекиси, альдегидов, аминов, гуанидинов, мочевины, карбамида, органических кислот. Срок годности средства: не менее 5 лет. Срок годности рабочих растворов средства: не менее 14 суток. Целевая активность: бактерицид (грамположительные, грамотрицательные бактерии), вирулицид (гепатит В, ВИЧ, полиомиелит и др), фунгицид (кандида, трихофитон, плесени), туберкулоцид, возбудители ООИ (чума, холера, туляремия, сибирская язва), ВБИ, анаэробная инфекция. Токсикология: класс опасности: не ниже – 4 при нанесении на кожу, при ингаляционном	Для обработки изделий медицинского назначения, для обработки поверхностей, Полимерная емкость не менее 1л.	фл	4461	50	223 050,00

	воздействия в виде паров, при введении в брюшину; не ниже – 3 при введении в желудок. Средство должно быть биоразлагаемое и экологически безопасное, сохранять свои свойства после замораживания и оттаивания, обладать хорошими моющими свойствами (100% эффективность удаления крови), не фиксировать органические загрязнения, не вызывать коррозии металлов. Приготовление рабочих растворов и обеззараживание объектов способами протирания должно быть разрешено без СИЗ органов дыхания и в присутствии пациентов. Должно быть разрешено применение в детских и неонатальных отделениях, родильных домах. Режимы обработки: Выход рабочего раствора из 1 литра концентрированного средства: - дезинфекция поверхностей по вирусному режиму не менее 100 л при времени экспозиции не более 30 минут; дезинфекция поверхностей по туберкулезному режиму не менее 100 л при времени экспозиции не более 30 минут; дезинфекция поверхностей по бактериальному режиму не менее 1000 л при времени экспозиции не более 30 минут; дезинфекция поверхностей по грибковой этиологии (кандидозы) не менее 200 л при времени экспозиции не более 30 минут; дезинфекция поверхностей при контаминации плесневыми грибами не менее 500 л при времени экспозиции не более 30 минут; дезинфекция поверхностей при ООИ не менее 2000 л при времени экспозиции не более 30 минут; дезинфекция любых объектов при анаэробных инфекциях не менее 33 л при времени экспозиции не более 30 минут; дезинфекция воздуха при инфекциях бактериальной и вирусной этиологии не менее 100 л при времени экспозиции не более 30 минут; при туберкулезе не менее 55 л при времени экспозиции не более 30 минут; генеральные уборки в хирургических отделениях не менее 100 л при времени экспозиции не более 30 минут; дезинфекция ИМН не менее 100 л при времени экспозиции не более 20 минут; при анаэробной инфекции не менее 33 л при времени экспозиции не более 30 минут; дезинфекция, совмещенная с ПСО ИМН не менее 200 л при времени экспозиции не более 30 минут (ручным и механизированным способом); эндоскопы не менее 100 л при времени экспозиции не более 20 минут (ручным и механизированным способом); ПСО ИМН механизированным способом не менее 2000 л при времени экспозиции не более 15 минут; ручным способом не менее 2000 л при времени экспозиции не более 30 минут; предварительная, предстерилизационная (или окончательная) очистка эндоскопов ручным способом не менее 2000 л при времени экспозиции не более 30 минут, механизированным способом не менее 2000 л не более 20 минут. Дезинфекция уборочного инвентаря, сантехники, столовой и лабораторной посуды, белья, куветов, комплектующих деталей наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования, обеззараживания отходов классов Б и В, остатков пищи, контейнеров для сбора и удаления медицинских отходов, жидких выделений и посуды из-под выделений больного.
--	---

3	Дезсредство должно содержать в своем составе в качестве АДВ полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) в интервале 0,6% - 0,8%, бензалконий хлорид (ЧАС) в интервале 1,1% - 1,3%, N,N-бис (3-аминопропил) додециламин (триамин) в интервале 2,7% - 2,9%, а также неонол, тетранатриевую соль ЭДТА, бутилдигликоль, бензотриазол и воду. Средство не должно содержать альдегидов, перекиси, хлора. pH средства должно быть разрешено в интервале от 10,5 до 12,5. Средство должно обладать бактерицидной, туберкулоцидной, вирулицидной и фунгицидной активностью. Средство должно быть разрешено к применению для: дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях; дезинфекция медицинского оборудования; дезинфекция ИМН ручным способом; дезинфекции совмещенной с ПСО, ИМН ручным и механизированным способами; дезинфекции, совмещенной с ПСО, гибких и жестких эндоскопов; ПСО не совмещенной с дезинфекцией ИМН; Срок годности не менее 5 лет, рабочих растворов не менее 35 дней. Для экспресс-контроля МЭК средство должно иметь индикаторные полоски.	Для обработки поверхностей, Еврофлакон объемом не менее 1 л.	фл	5060	50	253 000,00
4	Дезсредство в качестве АДВ должно содержать гликолевую кислоту в интервале 15,7% - 15,9%, бензалконий хлорид в интервале 11,5% - 11,7%, моноалкилфенол оксэтилированный, кислоту фосфоновую-1,2,4-трикарбоновую и воду. Средство не должно содержать третичных аминов, гуанидиновых оснований, альдегидов, перекиси водорода, спиртов и хлора. pH раствора с массовой долей 10,0 % должен быть в интервале от 1,5 до 3,5. Средство должно обладать бактерицидным (в т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидным, фунгицидным, а также спороцидным действием. Средство должно быть разрешено к применению для: дезинфекции поверхностей в помещениях, поверхностей аппаратов, приборов; дезинфекции медоборудования; ДВУ жестких и гибких эндоскопов; дезинфекции и стерилизации ИМН, включая жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним, хирургические и стоматологические инструменты ручным и механизированным способом (с применением ультразвука и в специализированных моечных машинах); дезинфекции, совмещенной с ПСО, ИМН; ПСО, не совмещенной с дезинфекцией, ИМН. Срок годности не менее 5 лет, рабочих растворов не менее 15 суток. Для экспресс-контроля МЭК средство должно иметь индикаторные полоски.	Для обработки изделий медицинского назначения, ПСО, для обработки поверхностей, Еврофлакон объемом не менее 1 л.	фл	5520	50	276 000,00

5	Тип средства: порошок. Состав средства: натрия перкарбонат не менее 42%, тетраацетилэтилендиамин (ТАЭД) не менее 5%, энзимный комплекс, а также сода кальцинированная. Массовая доля активного кислорода в средстве должна составлять не менее 6,0%. рН 1% водного раствора средства. Средство не должно содержать активного хлора, перекиси, альдегидов, третичных аминов, гуанидинов, мочевины, карбамида, органических кислот, спиртов, фенолов, четвертично-аммониевых соединений. Срок годности средства: не менее 5 лет, в не вскрытой упаковке производителя. Срок годности рабочих растворов средства: не менее 2 суток. Целевая активность: бактерицид (грамположительные, грамотрицательные бактерии), вирулицид (ЕСНО 6, полиомиелит), фунгицид (кандида, трихофитон, плесени), туберкулоцид (должно быть тестировано на Мусобастепит тегтае), возбудители ООИ (чума, холера), ВБИ (в т.ч. в отношении метициллин-резистентного золотистого стафилококка, кишечной палочки, синегнойной палочки); также средство должно обладать ооцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цистов и ооцистов простейших, яиц и личинок гельминтов). Токсикология: класс опасности: не ниже – 4 при нанесении на кожу, при ингаляционном воздействии в виде паров, при введении в брюшину; не ниже – 3 при введении в желудок. Средство должно обладать выраженными моющими и дезодорирующими свойствами, позволяющими совмещать очистку обрабатываемых поверхностей с их дезинфекцией, не должно фиксировать органические загрязнения, не должно вызывать коррозии металлов. Средство должно быть несовместимо с мылами и анионными поверхностно-активными веществами. Приготовление рабочих растворов и обеззараживание объектов способами протирания должно быть разрешено без СИЗ органов дыхания и в присутствии пациентов. Должно быть разрешено применение в детских и неонатальных отделениях, родильных домах. Режимы обработки: Выход рабочего раствора из 1 литра концентрированного средства: - дезинфекция поверхностей по вирусному режиму не менее 200 л при времени экспозиции не более 30 минут; дезинфекция поверхностей по туберкулезному режиму (М. Тегтае) не менее 200 л при времени экспозиции не более 30 минут; дезинфекция поверхностей по бактериальному режиму не менее 200 л при времени экспозиции не более 15 минут; дезинфекция поверхностей по грибковой этиологии (кандидозы) не менее 50 л при времени экспозиции не более 15 минут; дезинфекция поверхностей при контаминации плесневыми грибами не менее 33 л при времени экспозиции не более 15 минут; дезинфекция поверхностей при ООИ не менее 200 л при времени экспозиции не более 30 минут; дезинфекция поверхностей при ВБИ не менее 200 л при времени экспозиции не более 15 минут; при контаминации возбудителями паразитарных болезней (цистами и ооцистами простейших, яйцами и личинками гельминтов) не менее 200 л при времени экспозиции не менее 30 минут; дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха не менее 200 л при времени экспозиции не более 15 минут; дезинфекция куветов не менее 200 л при времени экспозиции не более 15 минут; генеральные уборки в хирургических отделениях	банка	5217	50	260 850,00
	Для дезинфекции оборудования (куветов, нарочно — дыхательной аппаратуры и т.д.), Полимерная емкость (банка) не менее 1 кг.				

не менее 200 л при времени экспозиции не более 15 минут; дезинфекция ИМН не менее 25 л при времени экспозиции не более 15 минут; дезинфекция, совмещенная с ПСО ИМН не менее 25 л при времени экспозиции не более 15 минут ручным способом; дезинфекция, совмещенная с ПСО ИМН не менее 200 л при времени экспозиции не более 10 минут механизованным способом; дезинфекция, совмещенная с ПСО эндоскопов не менее 25 л при времени экспозиции не более 15 минут (ручным и механизированным способом); ПСО ИМН ручным и механизированным способами не менее 200 л при времени экспозиции не более 10 минут; предварительная, предстерилизационная (или окончательная) очистка эндоскопов ручным и механизированным способами не менее 200 л при времени экспозиции не более 10 минут; ДВУ эндоскопов не менее 20 л при времени экспозиции не более 15 минут; стерилизация ИМН, включая эндоскопы и инструменты к ним, не менее 10 л при времени экспозиции не более 15 минут. Дезинфекция, стирка и отбеливание белья, совмещенные в одном процессе, ручным способом и в стиральных машинах, дезинфекция уборочного инвентаря, сантехники, столовой и лабораторной посуды, куветов, комплектующих деталей наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования.	6 Дезинфицирующее средство должно представлять собой таблетки округлой формы белого цвета с характерным запахом хлора, массой 3,3 - 3,5 г. Таблетки могут иметь на поверхности насечки, которые разрешают делить таблетку при приготовлении рабочих растворов. В качестве действующего вещества в состав средства входит натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - не менее 90,0%, а также вспомогательные вещества: карбонат натрия не менее 5,0%, адипиновая кислота не менее 5,0%. Масса активного хлора (АХ) в одной таблетке, минимум 1,5 гр, время растворения не более 10 минут. Средство должно обладать высокими бактерицидным действием в отношении широкого спектра грамм+ и грамм- бактерий (включая <i>S.aureus</i>, мультрезистентный стафилококк (MRSA), <i>P.aeruginosa</i>, возбудителей дизентерии, сальмонеллы, паратифа, брюшного тифа, холеры, чумы, туляремии, споробразующих микроорганизмов рода <i>Bacillus</i> и др., возбудителей внутрибольничных инфекций), туберкулоцидным, вирулицидным (в т.ч. против возбудителей гепатитов А, В, С, СПИД, герпеса, гриппа всех типов, паратифу, «птичьего» гриппа, SARS («атипичная пневмония»), аеновирусной, энтеровирусной (в т.ч. полиомиелит, Коксаки, ЕСНО), коронаровирусной, респираторно-синтициальной, риновирусной, рота вирусной, цитомегаловирусной инфекции и т.п.), фунгицидным (против патогенных грибов рода <i>Candida</i> и дерматофитов, а также должно быть эффективно в уничтожении и предупреждении появления плесени, в т.ч. в споровой форме) действием. Водные растворы должны быть прозрачные, иметь легкий запах хлора, не повреждать поверхности из дерева, стекла, полимерных материалов, а также посуду, игрушки, изделия медицинского назначения, предметы ухода за больными, изготовленные из
	банка 3300 100 330 000,00 Для проведения текущей и генеральной уборки, Банка 1 кг. (300 таблеток, 1 таб. 3, 3 — 3,5 гр.)

	коррозийных металлов, стекла, резины и пластмасс; должны иметь отбеливающие свойства. Средство по параметрам острой токсичности должно относиться к 3-4 классу малоопасных веществ при введении в желудок. не имеет кожно-резорбтивных, мутагенных, канцерогенных и сенсибилизирующих свойств Средство должно быть разрешено к применению для: - обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов, изделий медицинского назначения, белья, посуды, в том числе лабораторной (включая однократного использования), предметов для мытья посуды, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, медицинских отходов, игрушек, обуви из резины, пластмасс, резиновых ковров при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандида, дерматофитии) этиологии при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в ЛПО, включая акушерские стационары (кроме отделений неонатологии), клиник, микробиологических и др. лабораториях, в инфекционных очагах, на санитарном транспорте; - заключительной дезинфекции в детских учреждениях; - проведения генеральных уборок; Срок годности средства не менее 5 лет, рабочих растворов не менее 3 суток. Средство должно быть расфасовано в пластиковые банки весом не менее 1,0 кг, и содержащие не менее 300 таблеток. Потребительская упаковка средства должна содержать маркировку на казахском и русском языках.					
7	Средство представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до темно-желтого цвета, содержит в своем составе в качестве действующих веществ (ДВ) дицилдиметиламмоний хлорид - 9,6%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид - 1,0%, а также функциональные компоненты - ПАВ, ингибитор коррозии; pH средства: 5,0-7,0. Средство выпускается в полимерных емкостях объемом 1 л, 5 л. Срок годности средства - 3 года в упаковках изготовителя, срок годности рабочих растворов - 14 дней. Средство обладает бактерицидным, в том числе в отношении возбудителей особо-опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии), а также возбудителей внутрибольничных инфекций, включая метициллин-резистентный стафилококк, ванкомицин-резистентный энтерококк, синегнойную палочку, туберкулезный, в том числе на <i>Mycobacterium</i> туберкулеза, вирусный гепатит А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовируса, парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовируса, энтеровирусов, ротавирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа A/H1N1, гриппа человека, герпеса и др.), фунгицидным (в отношении грибов родов <i>Candida</i>, <i>Trichophyton</i>, плесневых грибов) действием. Средство обладает мощными свойствами, не портит обрабатываемые объекты, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов, рабочие растворы при текущих уборках не требуют дополнительного смывания с поверхностей. Средство применяется в медицинских организациях любого профиля, включая детские отделения и отделения неонатологии для: - дезинфекции медицинских отходов - изделий медицинского назначения однократного применения, не подлежащих утилизации, а также пищевых и прочих (жидкие отходы,	Для прививочного кабинета (дезинфекции остатков БЦЖ вакцины), Еврофлакон объемом 1 литр	6067	50	303 350,00	

	смывные воды (включая эндоскопические смывные воды) отходов, крови и других выделений больного (мочрота, моча, фекалии и прочие), посуды из-под выделений больного, вакцин, включая БЦЖ, при повреждении индивидуальной упаковки и с истекшим сроком годности						
8	Система (мешок) для ручного искусственного дыхания (ИВЛ), с клапаном давления, для взрослых, объем 1,5 л. Маска размер 5 обязательное наличие ручки на корпусе мешка для работы одной рукой	Реанимационный дыхательный мешок (устройство для ручного искусственного дыхания) для взрослых (вес более 50 кг), объём 1,5 л, с дыхательным объёмом 1000 мл (при сжатии двумя руками) и 800 мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным продолжноармированным шлангом длиной 3 м, с эластичным стандартным соединительным коннектором и коннектором резьбовым Male Sure Lock , для подачи кислорода высокой концентрации (при темпе 12 bpm для потока 5 л/мин-50%, 10 л/мин-83%, 15 л/мин-90%), подсоединяемый через штуцер, сопротивление на входе/выходе <3,0см H2O/<3,0см H2O, мертвое пространство 18 мл, с угловым шарнирным коннектором со встроенным клапаном вдоха под маску/ интубационную трубку 22M/15F, маска прозрачная лицевая с клапаном надува и кольцом маскодержателя, размер 5. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка индивидуальная, клинически чистая, бшт. в упаковке. Срок годности 5 лет от даты изготовления.	шт	10648	100	1 064 800,00	
	Итого					3 162 550,00	

2. Представленный потенциальным поставщиком ТОО «NAZAR GLOBAL TRADE» конверт с ценовыми предложениями и документы соответствуют требованиям, предусмотренным Правил.

3. Представленный потенциальным поставщиком ТОО «ПК Аврора» конверт с ценовыми предложениями и документы соответствуют требованиям, предусмотренным Правил.

4. Представленный потенциальным поставщиком ИП «НАМ» конверт с ценовыми предложениями и документы соответствуют требованиям, предусмотренным Правил

Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения:

№ Лота	Наименование	Тех. характеристика	Ед. изм.	Сумма	ТОО NAZAR GLOBAL TRADE БИН 060540011003	ТОО ПК Аврора БИН 100940013094	ИП Нам ИИН 530410400065
1	Представляет собой прозрачную жидкость зеленого цвета со специфичным запахом, хорошо смешивающуюся с водой. В состав средства в качестве действующих веществ входят: 22 грамма бензалкония хлорида (бензил-С12-18-алкилдиметиламмоний, хлориды), 17 грамм 2-феноксизтонола, 0,9 грамм аминоалкилглицина (амины, n-C10-16-алкилтриметиленединовые и продукты реакции из хлор уксусной кислоты, антикоррозийные добавки), бензионные тенсиды, рН средства 8,6. Рабочие растворы можно использовать в течение 30 дней после разведения	Для обработки поверхностей, Во флаконах объемом 2 л.	фл	451 500,00	5723		

2	Тип средства: жидкий концентрат. Состав средства: ЧАС (алкидиметилбензиламмоний хлорид, алкилдиметилэтилбензиламмония хлорид и дилецилдиметиламмония хлорид) – не более 18,5% (суммарно), спирт изопропиловый – не более 4%, функциональные компоненты рН средства 7,5+0,8. Средство не должно содержать активного хлора, перекиси, альдегидов, аминов, гуанидинов, мочевины, карбамида, органических кислот. Срок годности средства: не менее 5 лет. Срок годности рабочих растворов средства: не менее 14 суток. Целевая активность: бактерицид (грамположительные, грамотрицательные бактерии), вирулицид (гепатит В, ВИЧ, полиомиелит и др), фунгицид (кандида, трихофитон, плесени), туберкулоцид, возбудители ООИ (чума, холера, туляремия, сибирская язва), ВБИ, анаэробная инфекция. Токсикология: класс опасности: не ниже – 4 при нанесении на кожу, при ингаляционном воздействии в виде паров, при введении в брюшину; не ниже – 3 при введении в желудок. Средство должно быть биоразлагаемое и экологически безопасное, сохранять свои свойства после замораживания и оттаивания, обладать хорошими моющими свойствами (100% эффективность удаления крови), не фиксировать органические загрязнения, не вызывать коррозии металлов. Приготовление рабочих растворов и обеззараживание объектов способами протирания должно быть разрешено без СИЗ органов дыхания и в присутствии пациентов. Должно быть разрешено применение в детских и неонатальных отделениях, родильных домах. Режимы обработки: Выход рабочего раствора из 1 литра концентрированного средства:	Для обработки изделий медицинского назначения, для обработки поверхностей, Полимерная емкость не менее 1л.	фл	223 050,00	1990	1995
---	--	---	----	------------	------	------

- дезинфекция поверхностей по вирусному режиму не менее 100 л при времени экспозиции не более 30 минут; дезинфекция поверхностей по туберкулезному режиму не менее 100 л при времени экспозиции не более 30 минут; дезинфекция поверхностей по бактериальному режиму не менее 1000 л при времени экспозиции не более 30 минут; дезинфекция поверхностей по грибковой этиологии (кандидозы) не менее 200 л при времени экспозиции не более 30 минут; дезинфекция поверхностей при контаминации плесневыми грибами не менее 500 л при времени экспозиции не более 30 минут; дезинфекция поверхностей при ООИ не менее 2000 л при времени экспозиции не более 30 минут; дезинфекция любых объектов при анаэробных инфекциях не менее 33 л при времени экспозиции не более 30 минут; дезинфекция воздуха при инфекциях бактериальной и вирусной этиологии не менее 100 л при времени экспозиции не более 30 минут; при туберкулезе не менее 55 л при времени экспозиции не более 30 минут; генеральные уборки в хирургических отделениях не менее 100 л при времени экспозиции не более 30 минут; дезинфекция ИМН не менее 100 л при времени экспозиции не менее 20 минут; при анаэробной инфекции не менее 33 л при времени экспозиции не более 30 минут; дезинфекция, совмещенная с ПСО ИМН не менее 200 л при времени экспозиции не более 30 минут (ручным и механизированным способом); эндоскопы не менее 100 л при времени экспозиции не более 20 минут (ручным и механизированным способом); ПСО ИМН механизированным способом не менее 2000 л при времени экспозиции не более 15 минут; ручным способом не менее 2000 л при времени экспозиции не более 30 минут; предварительная, предстерилизационная				
--	--	--	--	--

	(или окончательная) очистка эндоскопов ручным способом не менее 2000 л при времени экспозиции не более 30 минут, механизированным способом не менее 2000 л не более 20 минут. Дезинфекция уборочного инвентаря, сантехники, столовой и лабораторной посуды, белья, кузовов, комплектующих деталей наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования, обеззараживания отходов классов Б и В, остатков пищи, контейнеров для сбора и удаления медицинских отходов, жидких выделений и посуды из-под выделений больного.							
3	Дезсредство должно содержать в своем составе в качестве АДВ полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) в интервале 0,6% - 0,8%, бензалконий хлорид (ЧАС) в интервале 1,1% - 1,3%, N,N-бис (3-аминопропил) додециламин (триамин) в интервале 2,7% - 2,9%, а также неонол, тетранатриевую соль ЭДА, бутилдигликоль, бензотриазол и воду. Средство не должно содержать альдегидов, перекиси, хлора. pH средства должен находиться в интервале от 10,5 до 12,5. Средство должно обладать бактерицидной, туберкулоцидной, вирулицидной и фунгицидной активностью. Средство должно быть разрешено к применению для: дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях; дезинфекция медицинского оборудования; дезинфекция ИМПН ручным способом; дезинфекции совмещенной с ПСО, ИМПН ручным и механизированным способами; дезинфекции, совмещенной с ПСО, гибких и жестких эндоскопов; ПСО не совмещенной с дезинфекцией ИМПН; Срок годности не менее 5 лет, рабочих растворов не менее 35 дней. Для экспресс-контроля МЭК средство должно иметь индикаторные полоски.	фл	253 000,00	2450	2490			

4	Дезсредство в качестве АДВ должно содержать гликолевую кислоту в интервале 15,7% - 15,9%, бензалконий хлорид в интервале 11,5% - 11,7%, моноалкилфенол оксигетилированный, кислоту фосфобутан-1,2,4-трикарбоновую и воду. Средство не должно содержать третичных аминов, гуанидиновых оснований, альдегидов, перекиси водорода, спиртов и хлора. pH раствора с массовой долей 10,0 % должен быть в интервале от 1,5 до 3,5. Средство должно обладать бактерицидным (в т.ч. микобактерии туберкулеза), вирулицидным, фунгицидным, а также спороцидным действием. Средство должно быть разрешено к применению для: дезинфекции поверхностей в помещениях, поверхностей аппаратов, приборов; дезинфекции медоборудования; ДВУ жестких и гибких эндоскопов; дезинфекции и стерилизации ИМН, включая жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним, хирургические и стоматологические инструменты ручным и механизированным способом (с применением ультразвука и в специализированных моечных машинах); дезинфекции, совмещенной с ПСО, ИМН; ПСО, не совмещенной с дезинфекцией, ИМН. Срок годности не менее 5 лет, рабочих растворов не менее 15 суток. Для экспресс-контроля МЭК средство должно иметь индикаторные полоски.	Для обработки изделий медицинского назначения, ПСО, для обработки поверхностей, Еврофлакон объемом не менее 1 л.	фл	276 000,00	3119		
---	--	---	----	------------	------	--	--

5	Тип средства: порошок. Состав средства: натрия перкарбонат не менее 42%, тетраацетилэтилендиамин (ТАЭД) не менее 5%, энзимный комплекс, а также сода кальцинированная. Массовая доля активного кислорода в средстве должна составлять не менее 6,0%. рН 1% водного раствора средства. Средство не должно содержать активного хлора, перекиси, альдегидов, третичных аминов, гуанидинов, мочевины, карбамида, органических кислот, спиртов, фенолов, четвертично-аммониевых соединений. Срок годности средства: не менее 5 лет, в не вскрытой упаковке производителя. Срок годности рабочих растворов средства: не менее 2 суток. Целевая активность: бактерицид (грамположительные, грамотрицательные бактерии), вирулицид (ЕСНО 6, полиомиелит), фунгицид (кандида, трихофитон, плесени), туберкулоцид (должно быть тестировано на <i>Mycobacterium</i> tetrae), возбудители ООИ (чума, холера), ВБИ (в т.ч. в отношении метициллин-резистентного золотистого стафилококка, кишечной палочки, синегнойной палочки); также средство должно обладать овицидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цистов и ооцистов простейших, яиц и личинок гельминтов). Токсикология: класс опасности: не ниже – 4 при нанесении на кожу, при ингаляционном воздействии в виде паров, при введении в брюшину; не ниже – 3 при введении в желудок. Средство должно обладать выраженными моющими и дезодорирующими свойствами, позволяющими совмещать очистку обрабатываемых поверхностей с их дезинфекцией, не должно фиксировать органические загрязнения, не должно	Для дезинфекции оборудования (кувезов, нарочно — дыхательной аппаратуры и т.д.) , Полимерная емкость (банка) не менее 1 кг.	банка	260 850,00	5007	
---	--	--	-------	------------	------	--

	вызывать коррозии металлов. Средство должно быть несовместимо с мылами и анионными поверхностно-активными веществами. Приготовление рабочих растворов и обеззараживание объектов способами протирания должно быть разрешено без СИЗ органов дыхания и в присутствии пациентов. Должно быть разрешено применение в детских и неонатальных отделениях, родильных домах. Режимы обработки: Выход рабочего раствора из 1 литра концентрированного средства: - дезинфекция поверхностей по вирусному режиму не менее 200 л при времени экспозиции не более 30 минут; дезинфекция поверхностей по туберкулезному режиму (M. Tubae) не менее 200 л при времени экспозиции не более 30 минут; дезинфекция поверхностей по бактериальному режиму не менее 200 л при времени экспозиции не более 15 минут; дезинфекция поверхностей по грибковой этиологии (кандидозы) не менее 50 л при времени экспозиции не более 15 минут; дезинфекция поверхностей при контаминации плесневыми грибами не менее 33 л при времени экспозиции не более 15 минут; дезинфекция поверхностей при ООИ не менее 200 л при времени экспозиции не более 30 минут; дезинфекция поверхностей при ВБИ не менее 200 л при времени экспозиции не более 15 минут; при контаминации возбудителями паразитарных болезней (цистами и ооцистами простейших, яйцами и личинками гельминтов) не менее 200 л при времени экспозиции не более 30 минут; дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха не менее 200 л при времени экспозиции не более 15 минут; дезинфекция кузовов не менее 200 л при времени экспозиции не более 15 минут; генеральные уборки в хирургических					
--	--	--	--	--	--	--

6	отделениях не менее 200 л при времени экспозиции не более 15 минут; дезинфекция ИМН не менее 25 л при времени экспозиции не более 15 минут; дезинфекция, совмещенная с ПСО ИМН не менее 25 л при времени экспозиции не более 15 минут ручным способом; дезинфекция, совмещенная с ПСО ИМН не менее 200 л при времени экспозиции не более 10 минут при времени экспозиции не более 10 минут механизированным способом; дезинфекция, совмещенная с ПСО эндоскопов не менее 25 л при времени экспозиции не более 15 минут (ручным и механизированным способом); ПСО ИМН ручным и механизированным способами не менее 200 л при времени экспозиции не более 10 минут; ДВУ эндоскопов не менее 20 л при времени экспозиции не более 15 минут; стерилизация ИМН, включая эндоскопы и инструменты к ним, не менее 10 л при времени экспозиции не более 15 минут. Дезинфекция, стирка и отбеливание белья, совмещенные в одном процессе, ручным способом и в стиральных машинах, дезинфекция уборочного инвентаря, сантехники, столовой и лабораторной посуды, кузевов, комплектующих деталей наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования. Дезинфицирующее средство должно представлять собой таблетки округлой формы белого цвета с характерным запахом хлора, массой 3,3 - 3,5 г. Таблетки могут иметь на поверхности насечки, которые разрешают делить таблетку при приготовлении рабочих растворов. В качестве действующего вещества в состав средства входит натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - не менее	Для проведения текущей и генеральной уборки, Банка 1 кг. (300 таблеток, 1 таб. 3,3 — 3,5 гр.)	банка	330 000,00	1975	1990	
---	--	---	-------	------------	------	------	--

					90,0%, а также вспомогательные вещества: карбонат натрия не менее 5,0%, адипиновая кислота не менее 5,0%. Масса активного хлора (AX) в одной таблетке, минимум 1,5 гр, время растворения не более 10 минут. Средство должно обладать высокими бактерицидным действием в отношении широкого спектра грамм+ и грамм- бактерий (включая <i>S. aureus</i>, мультирезистентный стафилококк (MRSA), <i>P. aeruginosa</i>, возбудителей дизентерии, сальмонеллеза, паратифа, брюшного тифа, холеры, чумы, туляремии, спорообразующих микроорганизмов рода <i>Bacillus</i> и др., возбудителей внутрибольничных инфекций), туберкулоцидным, вирулицидным (в т.ч. против возбудителей гепатитов A, B, C, СПИД, герпеса, гриппа всех типов, паратрипу, «птичьего» гриппа, SARS («атипичная пневмония»), аденовирусной, энтеровирусной (в т.ч. полиомиелит, Коксаки, ECHO), коронавирусной, респираторно-синтициальной, риновирусной, ротавирусной, цитомегаловирусной инфекции и т.п.), фунгицидным (против патогенных грибов рода <i>Candida</i> и дерматофитов, а также должно быть эффективно в уничтожении и предупреждении появления плесени, в т.ч. в споровой форме) действием. Водные растворы должны быть прозрачные, иметь легкий запах хлора, не повреждать поверхности из дерева, стекла, полимерных материалов, а также посуду, игрушки, изделия медицинского назначения, предметы ухода за больными, изготовленные из коррозионностойких металлов, стекла, резины и пластмасс; должны иметь отбеливающие свойства. Средство по параметрам острой токсичности должно относиться к 3-4 классу малоопасных веществ при введении в желудок. не иметь кожно-резорбтивных, мутагенных, канцерогенных и
--	--	--	--	--	---

сенсibiliзующих свойств Средство должно быть разрешено к применению для: - обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов, изделий медицинского назначения, белья, посуды, в том числе лабораторной (включая однократного использования), предметов для мытья посуды, предметов ухода за больными, уборочного инвентаря, медицинских отходов, игрушек, обуви из резин, пластмасс, резиновых коврик при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандида, дерматофитии) этиологии при проведении профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в ЛПО, включая акушерские стационары (кроме отделений неонатологии), клинических, микробиологических и др. лабораториях, в инфекционных очагах, на санитарном транспорте; - заключительной дезинфекции в детских учреждениях; - проведения генеральных уборок; Срок годности средства не менее 5 лет, рабочих растворов не менее 3 суток. Средство должно быть расфасовано в пластиковые банки весом не менее 1,0 кг, и содержащие не менее 300 таблеток. Потребительская упаковка средства должна содержать маркировку на казахском и русском языках.	
---	--

7	Средство представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до тёмно-жёлтого цвета, содержит в своем составе в качестве действующих веществ (ДВ) дидецилдиметиламмоний хлорид - 9,6%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид - 1,0%, а также функциональные компоненты - ПАВ, ингибитор коррозии; pH средства: 5,0-7,0. Средство выпускается в полимерных емкостях объемом 1 л, 5 л. Срок годности средства - 3 года в упаковках изготовителя, срок годности рабочих растворов - 14 дней. Средство обладает бактерицидным, в том числе в отношении возбудителей особо-опасных инфекций (чумы, холеры, туляремии), а также возбудителей внутрибольничных инфекций, включая метициллин-резистентный стафилококк, ванкомицин-резистентный энтерококк, синегнойную палочку, туберкулоцидным, в том числе на <i>Mycobacterium terrae</i>, вирулицидным, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа A/H1N1, гриппа человека, герпеса и др.), фунгицидным (в отношении грибов родов Кандида, Трихофитон, плесневых грибов) действием. Средство обладает мощными свойствами, не портит обрабатываемые объекты, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов, рабочие растворы при текущих уборках не требуют дополнительного смывания с поверхностей. Средство применяется в медицинских организациях любого профиля, включая	Для прививочного кабинета (дезинфекции остатков БЦЖ вакцины), Еврофлакон объемом 1 литр	303 350,00	2450	2499
---	--	---	------------	------	------

	детские отделения и отделения неонатологии для: - дезинфекции медицинских отходов – изделий медицинского назначения однократного применения, не подлежащих утилизации, а также пищевых и прочих (жидкие отходы, смывные воды (включая эндоскопические смывные воды) отходов, крови и других выделений больного (моча, моча, фекалии и прочие), посуды из-под выделений больного, вакцин, включая БЦЖ, при повреждении индивидуальной упаковки и с истекшим сроком годности								
8	Система (мешок) для ручного искусственного дыхания (ИВЛ), с клапаном давления, для взрослых, объем 1,5 л. Маска размер 5 обязательное наличие ручки на корпусе мешка для работы одной рукой	Реанимационный дыхательный мешок (устройство для ручного искусственного дыхания) для взрослых (вес более 50 кг), объём 1,5 л, с дыхательным объёмом 1000 мл (при сжатии двумя руками) и 800 мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным продольноармированным шлангом длиной 3 м, с эластичным стандартным соединительным коннектором и коннектором резьбовым Male Sure Lock, для подачи кислорода высокой концентрации (при темпе 12 bpm для потока 5 л/мин-50%, 10 л/мин-83%, 15 л/мин-90%), подсоединяемый через штуцер, сопротивление на входе/выходе <3,0см H2O/<3,0см H2O, мертвое пространство 18 мл, с угловым шарнирным коннектором со встроенным	шт	1 064 800,00					10200

		клапаном вдоха под маску/ интубационную трубку 22M/15F, маска прозрачная лицевая с клапаном надува и кольцом маскодержателя, размер 5. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка индивидуальная, клинически чистая, бшт. в упаковке. Срок годности 5 лет от даты изготовления.						
	Итого				3 162 550,00	1 119 990,00	548 200,00	1 020 000,00

- Отклоненные заявки отсутствуют.

- Экспертная комиссия отсутствует.

Дата и время представления ценовых предложений:

1. ИП «НАМ» - 15.05.2019г 16.43ч

2. ТОО «NAZAR GLOBAL TRADE» - 16.05.2019г 15.23ч

3. ТОО «ПК Аврора» - 16.05.2019г 12.25ч

Наименование потенциальных поставщиков, нет присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:

Предложение – ИП «НАМ» (Местонахождение: г. Алматы, ул. Кунаева 21Б оф. 74 является наименьшим по лоту 8). По результатам сопоставления ценовых предложений признать победителем ИП «НАМ» (Местонахождение: г. Алматы, ул. Кунаева 21Б оф. 74 является наименьшим), заключить с ИП «НАМ» договор закупа на сумму – 1 020 000,00 тенге 00 тьын.

Предложение – ТОО «NAZAR GLOBAL TRADE» (Местонахождение: г. Алматы, ул. Земнухова 19А, является наименьшим по лотам 1,2,3,4,5,6,7). По результатам сопоставления ценовых предложений признать победителем ТОО «NAZAR GLOBAL TRADE»

(Местонахождение: г. Алматы, Кунаева д 162/2 является наименьшим), заключить с ТОО «NAZAR GLOBAL TRADE» договор закупки на сумму -1 119 990,00 тенге 00тиын



Комиссия в составе:

Садуаева К.А.. (зам.директора) – председатель комиссии Сад
Троегубова О.А. - (гл.акушерка) – заместитель председателя Тр
Убулова Г.Т.(и.о.главного бухгалтера) – член комиссии Уб
Оразаева Ж.И (провизор) – член комиссии Ор
Бабаева З.М. (и.о.заведующий отделением ОАРИ ГН) – член комиссии Бл
Сабекова А.А. (заведующий лабораторией) – член комиссии Саб
Сарлыбаев Н. – (юрист) член комиссии Сар
Секретарь комиссии - Сатыбалдиева М.А.