

Протокол подведения итогов закупа

«Закуп лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения (далее – товар) для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи способом запроса ценовых предложений в соответствии согласно с Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»

ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» УЗ г.Алматы

г.Алматы

30 мая 2019г. 10.00ч

Присутствовали:

Садуева К.А.. (зам.директора) – председатель комиссии
Ахметова Д.Ш. - (гл.акушерка) – заместитель председателя
Убулова Г.Т.(и.о.главного бухгалтера) – член комиссии
Оразаева Ж.И (провизор) – член комиссии
Бабаева З.М. (заведующий отделением ОАРИТН) – член комиссии
Сабекова А.А. (заведующий лабораторией) – член комиссии
Сарлыбаев Н. – (юрист) член комиссии

1. ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Подведение итогов и определение победителей по запусу способом запроса ценовых предложений «Закуп лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения (далее – товар) для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи способом запроса ценовых предложений в соответствии согласно с Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»

2. ПОСТАНОВИЛИ:

1. Определить победителей и заключить договор закупа способом запроса ценовых предложений с потенциальными поставщиками в нижеследующем порядке:

В соответствии с «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов,

изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила):

Сумма выделенная на закуп составляет:

Итого: 10 323 030 (десять миллионов триста двадцать три тысяч тридцать тенге) 00тиын (таблица №1)

Таблица №1

№ лота	Международное /торговое непатентованное название	Характеристика	Ед.измер.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Кожный антисептик гель	Представляет собой гелеобразный готовый к применению раствор, содержащий в качестве действующих веществ: изопропиловый спирт (2-пропанол) не менее 50%, пропиловый спирт (1-пропанол) не менее 20% и хлоргексидинабиглюконат не менее 0,5% с добавлением гелеобразного функциональных компонентов. Не содержит кислот, активного кислорода, четвертично-аммониевые соединения, амины, фенолы и их производные. Класс опасности при введении в желудок и нанесении на кожу- 4. рН средства не более 7,0. Антибактериальная активность в отношении грамположительных (включая микобактерии туберкулёза) и грамотрицательных бактерий (кишечная палочка, золотистый стафилококк), вирулицидной активностью в отношении всех вирусов-патогенов человека (в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в том числе гепатита А,В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа А/H1N1, гриппа человека, герпеса и др.) и фунгицидной активностью в отношении грибов рода Кандида и дерматофитов. Средство обладает пролонгированным бактерицидным действием не менее 5часов. -обработка кожи операционного поля, локтевых сгибов, кожи перед введением катетеров и пункцией суставов – времяэкспозиции не более 2 минут; кожи инъекционного поля – время экспозиции не более 30 секунд;-дезинфекция небольших по площади и труднодоступных поверхностей в помещениях, поверхностей приборов, аппаратов, медицинского оборудования в ЛПУ; на санитарном транспорте: норма расхода не более 50 мл/м2 обрабатываемой поверхности. Вирулицид, туберкулоцид, дерматофитии – не более 10 минут, бактерицид – не более 1 минуты, кандидозы – не более 3 минут. Форма выпуска полимерная емкость 1л.	флаккон	1 600	3 200,00	5 120 000,00

	Жидкое антибактериальное мыло	Готовое к применению антибактериальное антисептическое мыло, в составе :вода деионизированная, лаурилсульфат натрия этоксилированный, кокоамидопропил бетаин, крктоглоукозид, ДЭА жирных кислот кокосового масла, хлорид натрия, глицерин, триклозан, аллантоин, парфюмерная композиция, консервант (Acticidemv), лимонная кислота, аллантоин, пищевой краситель Blue 1, отдушка. Антибактериальный компонент мыла (триклозан) активен в отношении золотистого стафилококка, кишечной палочки, грибов рода Кандида, плесени Aspergillinsniger и т.п. Средство не должно обладать раздражающим и аллергическим действием. Должно содержать специальные добавки, смягчающие и увлажняющие кожу рук, оказывающие противовоспалительное и ранозаживляющее действие. Предназначен для гигиенической обработки рук хирургов, оперирующего медицинского персонала в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ), гигиенической обработки рук работниками ЛПУ, роддомов, детских дошкольных и школьных учреждений, санаториев, домов отдыха, пансионатов, учреждений соцобеспечения, гигиенической обработки рук работников и посетителей предприятий пищевой промышленности, общественного питания, транспорта, в т.ч. железнодорожного, автотранспорта, водного транспорта, метрополитена, гигиенического мытья рук и тела населением в быту – нанести не более 5 мл средства нанести на влажные руки, вспенить в течение 30 сек., затем смыть проточной водой. Форма выпуска: полимерная емкость не менее 1 л	флакон	2 000	1 480,00	2 960 000,00
3	Кожный антисептик	Представляет собой готовый к применению кожный антисептик в виде прозрачной вязкой жидкости светло-зеленого цвета. В состав средства входит клатрат алкилдиметилбензиламмоний хлорид и алкилдиметил(этилбензил) аммоний хлорида с мочевиной -0,63%, изопропанол -45%, хлоргексидина биглюконат – 0,25%, функциональные и технологические добавки. Средство предназначено для обработки кожи операционного и инъекционного полей, обработки рук хирургов, операционных медицинских сестер, акушеров и других лиц, участвующих в проведении операций, приеме родов. Экспресс дезинфекция поверхностей и оборудования. Пролонгированное антимикробное действие в течении 3 часов. средство обладает моющими свойствами. Средство обладает антимикробной активностью: Бактерии (в т.ч. Микобактерии туберкулеза Mycobacterium terrae), вирусы, грибы. медицинского персонала и санитарной обработки кожных покровов пациентов в лечебно-профилактических учреждениях, для гигиенической обработки рук медицинских работников детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения. работников парфюмерно-косметических предприятий, общественного питания. Гигиеническая обработка рук 3 мл средства нанести на руки и втирать 30 сек. не более 1 мин. использовать только для наружного применения	флакон	1 500	970,00	1 455 000,00

	Мыло жидкое с дезинфицирующим эффектом (кожный антисептик) Антибактериальное»	Представляет собой готовый к применению кожный антисептик в виде прозрачной вязкой жидкости светло-зеленого цвета. В состав средства входит 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси)фенол (триклозан) – 0,5%, анионное поверхностно-активное вещество – 8,5%, функциональные и технологические добавки. средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных (кроме микобактерий туберкулеза) и грамотрицательных бактерий. Мыло предназначено для гигиенической обработки рук медицинского персонала и санитарной обработки кожных покровов пациентов в лечебно-профилактических учреждениях, для гигиенической обработки рук медицинских работников детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения. работников парфюмерно-косметических предприятий, общественного питания. Гигиеническая обработка рук 5 мл средства нанести на влажные кисти рук и образовавшейся пеной обработать руки в течение 1 мин. затем пену хорошо смыть водой. использовать только для наружного применения.	флакон	260	1 478,00	384 280,00
5	Кожный антисептик для обработки рук	кожный антисептик эффективен для обработки рук, соответствует требованиям ВОЗ. Состав: комплекс спиртов-65%, дидецилметиламмоний хлорид (ЧАС), -0,25-0,35. а также функциональные добавки, в том числе смягчающие и увлажняющие кожу. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, кишечных инфекций), вирусов (острые респираторные вирусные инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирус и пр.), грибов рода Кандида, Трихофитон, ротавируса человека. Активен в отношении возбудителей бактериальных, вкл. туберкулез M.tetrae. Средство предназначено для обработки рук хирургов, оперирующего персонала и гигиенической обработки рук медицинского персонала и пациентов лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), в том числе родильных домов, гигиенической обработки рук персонала на санитарном транспорте; обработки кожи ступней ног, обработки кожи перед введением катетеров и пункций суставов, обработки кожи операционных, инъекционных и пункционных полей пациентов (при инъекциях, пункциях, катетеризациях, других манипуляциях), локтевых сгибов доноров в ЛПУ, а также в условиях транспортировки в машинах скорой помощи и при чрезвычайных ситуациях; для дезинфекции медицинских инструментов. Обладает пролонгированным антимикробным действием в течение не менее 3 часов. Флакон объемом 1,0 л.	флакон	180	1 850,00	333 000,00
6	Средство дезинфицирующее (кожный антисептик)	Готовый к применению антисептик для 1л хирургической и гигиенической дезинфекции рук, 6 часов постоянного действия Быстрое наступление действия (через 15 сек., перед инъекцией) Широкий антисептический спектр • бактерицидный • фунгицидный • ограниченно вирулицидный (вкл. ВИЧ, вирусы гепатита В и С) Хорошая переносимость кожей. Данные о препарате Состав: 100 мл раствора содержат в качестве действующих веществ 1-пропанола 30%, 2-пропанола 45% и октенидиндигидрохлорида	флакон	10	7 075,00	70 750,00

		0,1% в качестве действующих веществ, а также функциональные добавки. Готовый раствор длительного действия (до 6 часов) применяется во всех случаях, когда показано применение йода. Предназначен для дезинфекции кожи перед инъекциями, пункциями, операционными вмешательствами, для обработки рук медицинского персонала Гигиеническая дезинфекция кожи – 15 секунд, перед пункциями, пред и постоперационная обработка кожи – 60 секунд Область применения Дезинфекция кожи: обработка кожи операционного поля обработка кожи перед постановкой центрального или периферического венозного катетера обработка кожи перед пункциями, биопсией и т.д. обработка кожи перед инъекциями и отбором проб крови обработка кожи перед иссечениями, наложением канюлей обработка кожи перед проведением эпидуральной и спинальной анестезии для обработки швов для гигиенической обработки рук и обработки рук хирургов Указания по применению 1. Дезинфекция кожи перед инъекциями, пункциями, иссечениями и т.д.: На обрабатываемый участок кожи нанести распылением или протереть тампоном, смоченным препаратом, оставить до наступления действия. Соблюдать экспозицию. При применении перед взятием пробы на определение глюкозы препарат должен высохнуть. 2. Перед пункциями суставов и предоперационной дезинфекцией кожи: При необходимости выбрать требуемый участок кожи. Вымыть пациента или соответствующее место 1 час до дезинфекции кожи. Нанести с помощью хорошо смоченного препаратом тампона или распыление. Следить, чтобы кожа была хорошо увлажнена. При применении клеющихся пленок при хирургических вмешательствах должен хорошо высохнуть, чтобы не нарушалось прилипание. Необходимо соблюдать особую осторожность (высыхание препарата) при использовании термокаутеров или других электрических прибор при применении 3. Обработка ран и швов Для обработки ран можно наносить с помощью тампона или прямым распылением на рану. Необходимо удалять тампоном излишки препарата. Операционные швы предпочтительно промокать тампоном, смоченным препаратом. 4. Хирургическая и гигиеническая дезинфекция рук При хирургической и гигиенической дезинфекции рук препарат наносят порциями, при этом в течение всего времени применения руки должны оставаться хорошо увлажненными. Микробиологическая активность Широкий спектр антибактериальной активности: грамположительные и грамотрицательные бактерии (включая микробактерии туберкулеза), вирусы (гепатит В, ВИЧ), грибы рода Кандида.				
	Итого					10 323 030,00

2. Предоставленный потенциальным поставщиком ТОО «LR-MED» конверт с ценовыми предложениями и документы соответствуют требованиям, предусмотренным Правил.

3. Предоставленный потенциальным поставщиком ТОО «EMIR Company» конверт с ценовыми предложениями и документы соответствуют требованиям, предусмотренным Правил.

4. Предоставленный потенциальным поставщиком ТОО «АлматМед» конверт с ценовыми предложениями и документы соответствуют требованиям, предусмотренным Правил.

Потенциальными поставщиками предоставлены следующие ценовые предложения:

№ лота	Международное /торговое непатентованное название	Краткое описание	Ед.изм	Кол-во	ТОО «АлматМед»	ТОО «EMIR Company»	ТОО «LR-MED»
					БИН 150440016057	БИН 150940013787	БИН 170640002182
					Цена	Цена	Цена
1	Кожный антисептик гель	Представляет собой гелеобразный готовый к применению раствор, содержащий в качестве действующих веществ: изопропиловый спирт (2-пропанол) не менее 50%, пропиловый спирт (1-пропанол) не менее 20% и хлоргексидинабиглюконат не менее 0,5% с добавлением гелеобразного функциональных компонентов. Не содержит кислот, активного кислорода, четвертично-аммониевые соединения, амины, фенолы и их производные. Класс опасности при введении в желудок и нанесении на кожу- 4. pH средства не более 7,0. Антибактериальная активность в отношении грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) и грамотрицательных бактерий (кишечная палочка, золотистый стафилококк), вирулицидной активностью в отношении всех вирусов-патогенов человека (в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в том числе гепатита А,В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов, ротавирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа A/H1N1, гриппа человека, герпеса и др.) и фунгицидной активностью в отношении грибов рода Кандида и дерматофитов. Средство обладает пролонгированным бактерицидным действием не менее 5 часов. -обработка кожи операционного поля, локтевых сгибов, кожи перед введением катетеров и пункцией суставов – времяэкспозиции не более 2 минут; кожи инъекционного поля – время экспозиции не более 30 секунд; обработка перчаток, надетых на руки персонала – не более 5 мл при времени экспозиции не более 1 минуты;	флакон	1 600	3 050,00		2900

		-дезинфекция небольших по площади и труднодоступных поверхностей в помещениях, поверхностей приборов, аппаратов, медицинского оборудования в ЛПУ; на санитарном транспорте: норма расхода не более 50 мл/м2 обрабатываемой поверхности. Вирулицид, туберкулоцид, дерматофитии – не более 10 минут, бактерицид – не более 1 минуты, кандидозы – не более 3 минут. Форма выпуска полимерная емкость 1л				
2	Жидкое антибактериальное мыло	Готовое к применению антибактериальное антисептическое мыло , в составе :вода деионизированная, лаурилсульфат натрия этоксилированный, кокоамидопропил бетаин, кокоглюкозид, ДЭА жирных кислот кокосового масла, хлорид натрия, глицерин, триклозан, аллантоин, парфюмерная композиция, консервант (Acticidemv), лимонная кислота, аллантоин, пищевой краситель Blue 1, отдушка. Антибактериальный компонент мыла (триклозан) активен в отношении золотистого стафилококка, кишечной палочки, грибов рода Кандида, плесени Aspergillinsniger и т.п. Средство не должно обладать раздражающим и аллергическим действием. Должно содержать специальные добавки, смягчающие и увлажняющие кожу рук, оказывающие противовоспалительное и ранозаживляющее действие.Предназначен для гигиенической обработки рук хирургов, оперирующего медицинского персонала в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ), гигиенической обработки рук работниками ЛПУ, роддомов, детских дошкольных и школьных учреждений, санаториев, домов отдыха, пансионатов, учреждений соцобеспечения, гигиенической обработки рук работников и посетителей предприятий пищевой промышленности, общественного питания, транспорта, в т.ч. железнодорожного, автотранспорта, водного транспорта, метрополитена, гигиенического мытья рук и тела населением в быту – нанести неболсе 5 мл средства нанести на влажные руки, вспенить в	флакон	2 000	1 250,00	1100

		течение 30 сек., затем смыть проточной водой. Форма выпуска: полимерная емкость не менее 1 л					
3	Кожный антисептик	Представляет собой готовый к применению кожный антисептик в виде прозрачной вязкой жидкости светло-зеленого цвета. В состав средства входят: клатрат алкилдиметилбензил аммоний хлорид и алкилдиметил(этилбензил) аммоний хлорида с мочевиной - 0,63%, изопропанол - 45%, хлоргексидина биглюконат - 0,25%, функциональные и технологические добавки. Средство предназначено для обработки кожи операционного и инъекционного полей, обработки рук хирургов, операционных медицинских сестер, акушеров и других лиц, участвующих в проведении операций, приеме родов. Экспресс дезинфекция поверхностей и оборудования. Пролонгированное антимикробное действие в течение 3 часов. производителя. средство обладает моющими свойствами. Средство обладает антимикробной активностью: Бактерии (в т.ч. Микобактерии туберкулеза <i>Mycobacterium terrae</i>), вирусы, грибы. медицинского персонала и санитарной обработки кожных покровов пациентов в лечебно-профилактических учреждениях, для гигиенической обработки рук медицинских работников детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения. работников парфюмерно-косметических предприятий, общественного питания. Гигиеническая обработка рук 3 мл средства нанести на руки и втирать 30 сек. не более 1 мин. использовать только для наружного применения. Форма выпуска: полимерная емкость не менее 0,1 л	флакон	1 500	968		962

	Мыло жидкое с дезинфицирующим эффектом (кожный антисептик) Антибактериальное	Представляет собой готовый к применению кожный антисептик в виде прозрачной вязкой жидкости светло-зеленого цвета. В состав средства входит 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси)фенол (триклозан) – 0,5%, анионное поверхностно-активное вещество – 8,5%, функциональные и технологические добавки. средство обладает моющими свойствами. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных (кроме микобактерий туберкулеза) и грамотрицательных бактерий. Мыло предназначено для гигиенической обработки рук медицинского персонала и санитарной обработки кожных покровов пациентов в лечебно-профилактических учреждениях, для гигиенической обработки рук медицинских работников детских дошкольных и школьных учреждений, учреждений соцобеспечения, работников парфюмерно-косметических предприятий, общественного питания. Гигиеническая обработка рук 5 мл средства нанести на влажные кисти рук и образовавшейся пеной обработать руки в течение 1 мин. затем пену хорошо смыть водой. использовать только для наружного применения. Форма выпуска полимерная емкость 1л.	Флакон	260	1 250,00		1100
5	Кожный антисептик для обработки рук	кожный антисептик эффективен для обработки рук, соответствует требованиям ВОЗ. Состав: комплекс спиртов-65%, дидецилметиламмоний хлорид (ЧАС), -0,25-0,35. а также функциональные добавки, в том числе смягчающие и увлажняющие кожу. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, кишечных инфекций), вирусов (острые респираторные вирусные инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирус и пр.), грибов рода Кандида, Трихофитон, ротавируса человека. Активен в отношении возбудителей бактериальных, вкл. туберкулез M.tetrae. Средство предназначено для обработки рук хирургов, оперирующего персонала и	флакон	180	1 750,00		1650

		гигиенической обработки рук медицинского персонала и пациентов лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), в том числе родильных домов, гигиенической обработки рук персонала на санитарном транспорте; обработки кожи ступней ног, обработки кожи перед введением катетеров и пункций суставов, обработки кожи операционных, инъекционных и пункционных полей пациентов (при инъекциях, пункциях, катетеризациях, других манипуляциях), локтевых сгибов доноров в ЛПУ, а также в условиях транспортировки в машинах скорой помощи и при чрезвычайных ситуациях; для дезинфекции медицинских инструментов. Обладает пролонгированным антимикробным действием в течение не менее 3 часов. Флакон объемом 1,0 л.					
6	Средство дезинфицирующее (кожный антисептик)	Готовый к применению антисептик для 1л хирургической и гигиенической дезинфекции рук, 6 часов постоянного действия Быстрое наступление действия (через 15 сек., перед инъекцией) Широкий антисептический спектр • бактерицидный • фунгицидный • ограниченно вирулицидный (вкл. ВИЧ, вирусы гепатита В и С) Хорошая переносимость кожей. Данные о препарате Состав: 100 мл раствора содержат в качестве действующих веществ 1-пропанола 30%, 2-пропанола 45% и октенидиндигидрохлорида 0,1% в качестве действующих веществ, а также функциональные добавки. Готовый раствор длительного действия (до 6 часов) применяется во всех случаях, когда показано применение йода. Предназначен для дезинфекции кожи перед инъекциями, пункциями, операционными вмешательствами, для обработки рук медицинского персонала Гигиеническая дезинфекция кожи – 15 секунд, перед пункциями, пред и постоперационная обработка кожи – 60 секунд Область применения Дезинфекция кожи: обработка кожи операционного поля обработка кожи перед	флакон	10		7 075,00	

	постановкой центрального или периферического венозного катетера обработка кожи перед пункциями, биопсией и т.д. обработка кожи перед инъекциями и отбором проб крови обработка кожи перед иссечениями, наложением канюлей обработка кожи перед проведением эпидуральной и спинальной анестезии для обработки швов для гигиенической обработки рук и обработки рук хирургов Указания по применению 1. Дезинфекция кожи перед инъекциями, пункциями, иссечениями и т.д.: На обрабатываемый участок кожи нанести распылением или протереть тампоном, смоченным препаратом, оставить до наступления действия. Соблюдать экспозицию. При применении перед взятием пробы на определение глюкозы препарат должен высохнуть. 2. Перед пункциями суставов и предоперационной дезинфекцией кожи: При необходимости выбрить требуемый участок кожи. Вымыть пациента или соответствующее место 1 час до дезинфекции кожи. Нанести с помощью хорошо смоченного препаратом тампона или распыление. Следить, чтобы кожа была хорошо увлажнена. При применении клеящихся пленок при хирургических вмешательствах должен хорошо высохнуть, чтобы не нарушалось прилипание. Необходимо соблюдать особую осторожность (высыхание препарата) при использовании термокаутеров или других электрических прибор при применении 3. Обработка ран и швов Для обработки ран можно наносить с помощью тампона или прямым распылением на рану. Необходимо удалять тампоном излишки препарата. Операционные швы предпочтительно промокать тампоном, смоченным препаратом. 4. Хирургическая и гигиеническая дезинфекция рук При хирургической и гигиенической дезинфекции рук препарат наносят порциями, при этом в течение всего времени применения руки должны оставаться хорошо увлажненными. Микробиологическая активность Широкий спектр антибактериальной активности:				
--	--	--	--	--	--

	грамположительные и грамотрицательные бактерии (включая микробактерии туберкулеза), вирусы (гепатит В, ВИЧ), грибы рода Кандида.					
Итого				9 472 000,00	70 750,00	8 866 000,00

- Отклоненные заявки отсутствуют.

- Экспертная комиссия отсутствует.

Дата и время представления ценовых предложений:

1. ТОО «АлматМед» -28.05.2019г 11.25ч

2. ТОО «LR-MED» -29.05.2019г 15.37ч

3. ТОО «EMIR Company»- 29.05.2019г 16.25ч

Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:

1. ТОО «EMIR Company»

Предложение – **ТОО «LR-MED»** (Местонахождение:г.Алматы, мкр.Айгерим 2 ул.Кожуханова 79, является наименьшим по лотам 1,2,3,4,5). По результатам сопоставления ценовых предложений признать победителем **ТОО «LR-MED»** (Местонахождение:г.Алматы, мкр.Айгерим 2 ул.Кожуханова 79, является наименьшим), заключить с **ТОО «LR-MED»** договор закупа на сумму – **8 866 000** тенге **00**тиын.

Предложение – **ТОО «EMIR Company»** (Местонахождение:г.Алматы, ул.Айтиева 13 пр-4, является наименьшим по лоту 6). По результатам сопоставления ценовых предложений признать победителем **ТОО «EMIR Company»** (Местонахождение:г.Алматы, ул.Айтиева 13 пр-4, является наименьшим), заключить с **ТОО «EMIR Company»** договор закупа на сумму – **70 750** тенге **00**тиын

Комиссия в составе:

Садуаева К.А.. (зам.директора) – председатель комиссии

Ахметова Д.Ш. - (гл. акушерка) – заместитель председателя

Убулова Г.Т.(и.о.главного бухгалтера) – член комиссии

Оразаева Ж.И (провизор) – член комиссии

Бабаева З.М. (заведующий отделением ОАРИТН) – член комиссии

Сабеева А.А. (заведующий лабораторией) – член комиссии

Сарлыбаев Н. – (юрист) член комиссии

Секретарь тендерной комиссии:

Сатыбалдиева М.А. – бухгалтер государственных закупок

